



Guadeloupe : Décembre plutôt chaud avec cumuls très hétérogènes. Janvier 2025 vu normal à plus humide.



Températures




Analyse agro sur les températures

- La tendance des températures de 2023 et 2024 a montré une grande élévation de températures sur les deux semestres par rapport aux dix dernières années. Ce qui démontre que les années 2023 et 2024 ont été les plus chaudes au cours de ces dix dernières années sur l'ensemble de la Guadeloupe.
- Sur la station de Capesterre Bois-débout, la saison sèche (décembre à Mai) et la saison pluvieuse (Juin à Novembre) entre 2023 et 2024 ont montré une augmentation de température moyenne de 0,3 °C par rapport aux dix dernières années.
- Les données de températures de la station Capesterre- Bois débout du mois de décembre n'ont pas été enregistré aux deux premières décades. La 3ème décade montre des températures qui baissent. Les baisses de températures sont favorables pour la nouaison des légumes fruits mais restent défaillantes pour leurs remplissages.
- il faudra adapter ses itinéraires techniques par exemple, en augmentant la densité des plants maraîchers par m² afin d'augmenter son rendement.
- Pour la banane, elles ont été défavorables pour son remplissage, avec des coefficients carton/régime qui baissent. Par contre, il a été signalé une pression forte de la cercosporiose noire sur le bananier en Basse – Terre d'après les bulletins hebdomadaires sur la surveillance de la cercosporiose noire du bananier.
- Il faudra donc intensifier les interventions sur la culture (coupe feuille) et respecter les calendriers de traitements.
- Les prévisions montrent que les températures vont continuer de baisser au mois de Janvier 2025 mais resteront légèrement chaudes que la normale saisonnière.

Bien que l'élaboration des prévisions météorologiques mette en œuvre les ressources les plus modernes de la technique, les Prestations Météorologiques transmises qui constituent l'assistance de Météo-France ne traduisent que l'évolution la plus probable d'un ensemble d'éléments que les Prestations Météorologiques aient été produites par Météo-France ou par d'autres services nationaux ou tiers. Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque nature qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des Prestations Météorologiques.

Précipitations :



Analyse agro pour les précipitations :

- À Capesterre, il a été constaté une augmentation de pluies de 56% entre 2015-2024 en saison sèche et de 23% en saison de pluies. Ce qui montre que le changement climatique est réel et nous devons adapter nos calendriers culturaux en fonction.
- Le mois de décembre a été globalement pluvieux avec une répartition hétérogène au sud (avec des excédents jusqu'à +60 à 80% par endroit) et au nord de Basse – Terre (des déficits de – 40% à – 50% parfois). La deuxième décennie a connu les moments les plus pluvieux avec trois épisodes intenses dont le dernier atteint les 55 mm la journée.
- La pluviométrie de décembre 2024 a été légèrement inférieure à celle de l'année dernière qui était anormalement supérieure à la normale saisonnière.
- Le temps pluvieux de ce mois a favorisé une bonne condition (temps pluvieux + baisses de températures) en alimentation hydrique des plantes qui a entraîné des rendements acceptables en cette période de début de la saison sèche. Cependant, cette situation en saison sèche montre que le dérèglement climatique est un fait.
- Le cumul de pluies à entraîner quand même des inondations de parcelles et la coulure des fleurs des cultures en place. Il faut mettre en place des systèmes de drainage sur nos parcelles afin d'éviter l'asphyxie des plants aux systèmes racinaires fragiles.
- Les prévisions montrent que la pluviométrie du mois de janvier 2025 sera déficitaire par rapport à la normale saisonnière des dix dernières années.



BULLETIN CLIMATIQUE MENSUEL AGRICOLE

décembre 2024



Analyse et tendance climatique :

Bilan de décembre 2024 en Basse-Terre

Ce mois est marqué par une pluviométrie très disparate, se concentrant surtout en deuxième décennie et avec des averses orageuses parfois stationnaires sur le flanc oriental du volcan notamment. Les cumuls quotidiens dépassent parfois les 100 mm sur Capesterre-Belle-Eau ou Goyave. Tout le sud de la Basse-Terre termine en excédent avec jusqu'à +60 à +80% à Vieux-Habitants ou Capesterre-Belle-Eau.

A l'inverse, le nord de la Basse-Terre est peu affecté, les averses sont plus fugaces et mobiles et les déficits enregistrés se situent autour de -40 à -50% autour de Sainte-Rose.

Sur une bande centrale entre Bouillante et Petit-Bourg, les cumuls sont plus proches des normales.

Du côté du mercure, malgré un intermède remarquablement frais en toute fin de mois, l'océan est toujours plus chaud que la normale donc les températures sont une fois de plus au-dessus des normales avec des minimales et des maximales autour de +0,5 à +1°C par rapport à la normale pour un mois de décembre. C'est dans le secteur de Capesterre-Belle-Eau que ce mois de décembre est le plus chaud par rapport à la normale.

Finalement, décembre 2024 vient se classer dans les 5 mois de décembre les plus chauds de ces 35 dernières années. C'est même le plus chaud à Capesterre-Belle-Eau. Côté pluies, il est dans la normale 2014-2023.

Côté pluies, il est parmi les 5 mois de décembre les plus secs de ces 35 dernières années au nord et parmi les 5 mois de décembre les plus humides au sud.

Prévisions pour janvier 2025 en Basse-Terre

La tendance mensuelle du mois de janvier 2025 affiche une pluviométrie de saison à légèrement déficitaire en première quinzaine et de saison à légèrement excédentaire en deuxième quinzaine.

Les modèles prévoient des températures légèrement plus chaudes que la normale (+0,5 à +1°C) pour toute la durée du mois.

CONTEXTE CLIMATIQUE

Sur le dernier trimestre, de façon générale, les températures de surface des océans se refroidissent dans tous les bassins de la planète.

Dans l'océan Pacifique, l'ENSO (El Niño Southern Oscillation) est dans une phase Niña très faible, l'anomalie froide le long de l'équateur progressant toutefois en surface.

Dans l'océan Indien, après une phase négative, l'indice du dipôle de température de surface océanique équatoriale (IOD) est désormais proche de la neutralité dans les modèles.

Dans l'océan Atlantique, autour des Antilles et dans les eaux tropicales nord du bassin, les températures de surface de la mer continuent à s'affaiblir progressivement même elles sont toujours légèrement plus chaudes que la normale. Quelques eaux plus froides que la normale entre le Canada et le nord de l'arc antillais semblent en légère résorption.

ÉVOLUTION DU CONTEXTE CLIMATIQUE

Sur l'ensemble des bassins océaniques de la planète, la tendance sur le trimestre janvier-février-mars est toujours à ce lent refroidissement général.

Au-dessus du Pacifique, la phase Niña s'installe temporairement mais reste légère. Tous les modèles sont en accord pour un retour rapide à des conditions neutres. Des télé-connexions restent en place, mais n'ont quasiment rien de significatif à transmettre vers notre bassin.

Bien que l'élaboration des prévisions météorologiques mette en œuvre les ressources les plus modernes de la technique, les Prestations Météorologiques transmises qui constituent l'assistance de Météo-France ne traduisent que l'évolution la plus probable d'un ensemble d'éléments que les Prestations Météorologiques aient été produites par Météo-France ou par d'autres services nationaux ou tiers. Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque nature qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des Prestations Météorologiques.



BULLETIN CLIMATIQUE MENSUEL AGRICOLE

décembre 2024



Bien que l'élaboration des prévisions météorologiques mette en oeuvre les ressources les plus modernes de la technique, les Prestations Météorologiques transmises qui constituent l'assistance de Météo-France ne traduisent que l'évolution la plus probable d'un ensemble d'éléments que les Prestations Météorologiques aient été produites par Météo-France ou par d'autres services nationaux ou tiers. Météo-France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute perte ou tout dommage de quelque nature qu'il soit résultant de l'interprétation et/ou de l'utilisation des Prestations Météorologiques.

INSTITUT TECHNIQUE TROPICAL IT2
C/o BANAMART
Bois-Rouge | 97224 DUCOS - MARTINIQUE
www.it2.fr

Météo France, Direction Antilles Guyane
BP 645 / 97200 Fort de France
<https://meteofrance.mq> - <https://meteofrance.gp>